

Základy kombinatoriky a klasické pravděpodobnosti

Jiří Fišer

10. 2. 2026

Obsah

- 1 Základní informace o kurzu
- 2 Úvodní poznámky o pravděpodobnosti a statistice
- 3 Kombinatorické pravidlo součinu a součtu, princip inkluze a exkluze
- 4 Skupiny bez opakování
 - ▶ Variace
 - ▶ Permutace
 - ▶ Kombinace
- 5 Skupiny s opakováním
 - ▶ Variace
 - ▶ Permutace
 - ▶ Kombinace
- 6 Pravděpodobnost - jev a operace s jevy

Základní informace ke kurzu

● Online zdroje

- ▶ IO (prezentace, skripta) – to stačí
- ▶ Otipka, P., Šmajstrla, V. *Pravděpodobnost a statistika*. VŠB TU Ostrava.

<http://home1.vsb.cz/~oti73/cdpast1/>

- ▶ a mnoho dalších, včetně video-prezentací na YT, AI

● **Zápočet:** aktivní účast na cvičeních, průběžné domácí úkoly, test?, maximálně tři neomluvené absence.

● **Zkouška:**

- ▶ písemný zkouškový test (praktické příklady a teoretické otázky), ústní dozkoušení,
- ▶ prokázat znalosti základní pojmů, orientaci v problematice a demonstrovat znalosti na příkladech.

Náhoda a pravděpodobnost

Pokus = experiment, uskutečněný při přesném dodržení předepsaných podmínek

- **nenáhodný:** 1 výsledek
např. zahříváme-li vodu na 100 °C při atmosférickém tlaku 1015 hPa, nastane var
- **náhodný:** 2 a více různých výsledků
např. hod mincí; hod kostkou; volba otázky u maturity; střelba na terč; podání léku pacientovi

Co je to pravděpodobnost?

Náhoda a pravděpodobnost

Pravděpodobnost = naděje, s jakou nastanou jevy, které nás zajímají

- číslo mezi nulou a jedničkou
- čím je hodnota blíže jedničce, tím vyšší je naděje, že daný jev nastane
- popisuje náhodný pokus pomocí matematických (pravděpodobnostních) modelů

Zakladatelé moderní teorie pravděpodobnosti

- Úlohy o pravděpodobnosti výhry v hazardních hrách



(a) Blaise Pascal (1623-1662)



(b) Pierre de Fermat (1601-1665)  

Hazardní hry v kostky

- **hod 1 kostkou:** padne alespoň 1 šestka ve 4 hodech → **zisk**
- **hod 2 kostkami:** padne alespoň 1 dvojice šestek ve 24 hodech → **ztráta**



Chevalier de Mére (1607-1684)
vl. jménem Antoine Gombaud

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Klasická pravděpodobnost

- konečný počet výsledků pokusu
- výsledky pokusu jsou stejně pravděpodobné

Klasická pravděpodobnost

$$P(A) = \frac{\text{počet příznivých výsledků jevu } A}{\text{počet všech možných výsledků}}$$

Příklad: Hod pravidelnou šestistrannou kostkou

- počet možných výsledků pokusu: 6 (padne 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6)
 - ▶ padne číslo 6: 1 příznivý výsledek $\Rightarrow P(A) = 1/6 \doteq 0,17$
 - ▶ padne sudé číslo: 3 příznivé výsledky (2, 4, 6)
 $\Rightarrow P(B) = 3/6 = 1/2 = 0,5$
 - ▶ padne číslo 10: žádný příznivý výsledek $\Rightarrow P(D) = 0/6 = 0$

Co to je statistika?

- popisná statistika

- ▶ názorně představuje data pomocí tabulek, grafů a jednoduchých číselných charakteristik

- matematická statistika

- ▶ data tvoří výběr z nějaké větší populace
- ▶ zobecňuje závěry platné pro naše data na celou populaci

1. Kombinatorika

- zabývá se vlastnostmi **konečných** množin
 - ▶ vytváření navzájem **různých množin** (skupin) z daných prvků
 - ▶ určení **počtu** takto vzniklých množin
 - ▶ podle toho, zda se **prvky** v jednotlivých skupinách **mohou či nemohou opakovat**, rozlišujeme
 - ★ skupiny s opakováním
 - ★ skupiny bez opakování

1.1 Základní kombinatorická pravidla

Příklad (Dvojciferná čísla)

Určete **počet** všech přirozených **dvojciferných čísel**, v jejichž zápisu se **každá číslice** vyskytuje **nejvýše jednou**.

Nějaké nápady?

Základní kombinatorická pravidla

Příklad (Dvojciferná čísla)

Určete **počet** všech přirozených **dvojciferných čísel**, v jejichž dekadickém zápisu se **každá číslice** vyskytuje **nejvýše jednou**.

Řešení A

- **desítky:** číslice $1, 2, \dots, 9 \rightarrow 9$ možností
- **jednotky:** číslice 0 a jakákoliv z 8 číslic různá od číslice na místě desítek $\rightarrow 9$ možností

$$\Rightarrow 9 \cdot 9 = 81 \text{ různých dvojciferných čísel}$$

Kombinatorické pravidlo součinu

Kombinatorické pravidlo součinu

Kombinatorické pravidlo součinu

Nechť množina A_i má n_i prvků pro $i = 1, \dots, k$.

Pak počet všech uspořádaných k -tic $(a_1, \dots, a_k)$,

kde $a_1 \in A_1, \dots, a_k \in A_k$, jejichž první člen lze vybrat n_1 způsoby, druhý n_2 způsoby, $\dots$, k -tý člen n_k způsoby,

je roven součinu

$$\prod_{i=1}^k n_i = n_1 \cdot n_2 \cdots n_k.$$

Kombinatorické pravidlo součtu

Příklad (Dvojciferná čísla)

Určete **počet** všech přirozených **dvojciferných čísel**, v jejichž zápisu se **každá číslice** vyskytuje **nejvýše jednou**.

Řešení B

- D ... množina všech přirozených dvojciferných čísel $\rightarrow |D|=90$ možností
- S ... množina všech přirozených dvojciferných čísel se stejnými číslicemi $\rightarrow |S|=9$ možností
- R ... množina všech přirozených dvojciferných čísel s různými číslicemi

$$R \cup S = D, \quad R \cap S = \emptyset, \quad |R| + |S| = |D|$$

$$\Rightarrow |R| = 90 - 9 = 81 \text{ různých dvojciferných čísel}$$

Kombinatorické pravidlo součtu

Kombinatorické pravidlo součtu

Nechť množina A_i má n_i prvků pro $i = 1, \dots, k$ a necht' jsou množiny A_i po dvou **disjunktní**.

Pak pro **počet prvků sjednocení** těchto množin platí

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_k.$$

- nejsou-li množiny disjunktní → **Princip inkluze a exkluze**

Princip inkluze a exkluze

Nechť jsou dány množiny A_i pro $i = 1, \dots, k$ a $|A_i|$ označuje počet prvků i -té množiny ($i = 1, \dots, k$). Potom pro **počet prvků sjednocení** množin $A_1, \dots, A_k$ platí

$$\left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| = \sum_{i=1}^k |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < s \leq k} |A_i \cap A_j \cap A_s| - \dots + (-1)^{k-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k|.$$

$$k = 2: \quad |A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$$

$$k = 3: \quad |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

Princip inkluze a exkluze - příklad

Příklad (Sportovní kluby)

*Ve městě fungují dva sportovní kluby. Fotbalový klub má dvanáct členů, tenisový klub devět. Přitom tři fotbalisté hrají i tenis. **Kolik osob celkem je členem nějakého klubu?***

Nějaké nápady?

Princip inkluze a exkluze - příklad

Příklad (Sportovní kluby)

*Ve městě fungují dva sportovní kluby. Fotbalový klub má dvanáct členů, tenisový klub devět. Přitom tři fotbalisté hrají i tenis. **Kolik osob celkem je členem nějakého klubu?***

Řešení:

- počet členů fotbalového klubu: $|A| = 12$
- počet členů tenisového klubu: $|B| = 9$
- počet osob ve fotbalovém i tenisovém klubu: $|A \cap B| = 3$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 12 + 9 - 3 = 18 \text{ osob}$$

1.2 Skupiny bez opakování

Kolika způsoby lze z n prvkové množiny $\{a_1, \dots, a_n\}$ vybrat $k \leq n$ různých prvků?

- uspořádaná k -tice: **variace**, **permutace**
- neuspořádaná k -tice: **kombinace**

I. Variace

Počet k -prvkových variací

Z množiny $M = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n\}$ vybíráme uspořádané k -tice

uspořádaná k -tice	1.člen	2.člen	...	$(k-1)$.člen	k .člen
počet možností	n	$n-1$	...	$n-(k-2)$	$n-(k-1)$ $= n-k+1$

kombinatorické pravidlo součinu

$$V_k(n) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

nebo také

$$V_k(n) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \frac{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

I. Variace

Počet k -prvkových variací

Z množiny $M = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n\}$ vybíráme uspořádané k -tice

uspořádaná k -tice	1.člen	2.člen	$\dots$	$(k-1)$.člen	k .člen
počet možností	n	$n-1$	$\dots$	$n-(k-2)$	$n-(k-1)$ $= n-k+1$

kombinatorické pravidlo součinu

$$V_k(n) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$$

nebo také

$$V_k(n) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \frac{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 1}{(n-k) \cdot (n-k-1) \cdot \dots \cdot 1} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Variace

Variace je libovolná **uspořádaná** k -tice sestavená z prvků množiny o n prvcích tak, že každý se v ní vyskytuje **nejvýše jednou** (**záleží na pořadí** prvků v této k -tici a žádný z jejích prvků se **nesmí opakovat**).

Počet všech k -prvkových variací sestavených z n -prvkové množiny je roven číslu

$$V_k(n) = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad k \leq n.$$

Variace - příklad vlajka

Příklad (Vlajka)

Sestavujeme vlajku ze tří různobarevných vodorovných pruhů. K dispozici jsou bílý, červený, modrý, zelený a žlutý pruh látky.

- a) *Kolik vlajek lze sestavit?*
- b) *Kolik jich má modrý pruh?*
- c) *Kolik jich má modrý pruh uprostřed?*
- d) *Kolik jich nemá červený pruh uprostřed?*

Nějaký nápad?

Příklad (Vlajka)

Sestavujeme vlajku ze tří různobarevných vodorovných pruhů. K dispozici jsou bílý, červený, modrý, zelený a žlutý pruh látky.

- a) *Kolik vlajek lze sestavit?*
- b) *Kolik jich má modrý pruh?*
- c) *Kolik jich má modrý pruh uprostřed?*
- d) *Kolik jich nemá červený pruh uprostřed?*

Řešení a)

- vlajka - 3 různé pruhy z 5 různých barev
- záleží na pořadí pruhů

⇒ tříčlenné variace z 5 prvků

$$V_3(5) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60 \text{ možností}$$

Příklad (Vlajka)

Sestavujeme vlajku ze tří různobarevných vodorovných pruhů. K dispozici jsou bílý, červený, modrý, zelený a žlutý pruh látky.

- b) *Kolik jich má modrý pruh?*
- c) *Kolik jich má modrý pruh uprostřed?*

Řešení b) vlajka s modrým pruhem

- modrý pruh - 3 způsoby umístění (nahoru, doprostřed, dolů)
- zbývající 2 barevné pruhy - 2 různé pruhy ze 4 různých barev

$$V_2(4) = 4 \cdot 3 = 12 \text{ možností}$$

⇒ kombinatorické pravidlo součinu

$$3 \cdot V_2(4) = 3 \cdot 12 = 36 \text{ možností}$$

Příklad (Vlajka)

Sestavujeme vlajku ze tří různobarevných vodorovných pruhů. K dispozici jsou bílý, červený, modrý, zelený a žlutý pruh látky.

- b) Kolik jich má modrý pruh?
- c) *Kolik jich má modrý pruh uprostřed?*
- d) Kolik jich nemá červený pruh uprostřed?

Řešení b) vlajka s modrým pruhem

- modrý pruh - 3 způsoby umístění (nahoru, doprostřed, dolů)
- zbývající 2 barevné pruhy - 2 různé pruhy ze 4 různých barev

$$V_2(4) = 4 \cdot 3 = 12 \text{ možností}$$

⇒ kombinatorické pravidlo součinu

$$3 \cdot V_2(4) = 3 \cdot 12 = 36 \text{ možností}$$

Řešení c) *vlajka s modrým pruhem uprostřed*

$$V_2(4) = 12 \text{ možností}$$

Příklad (Vlajka)

Sestavujeme vlajku ze tří různobarevných vodorovných pruhů. K dispozici jsou bílý, červený, modrý, zelený a žlutý pruh látky.

d) *Kolik jich nemá červený pruh uprostřed?*

Řešení d) vlajka, která nemá červený pruh uprostřed

- červený pruh uprostřed - $V_2(4) = 12$ možností
- vlajka (3 různé pruhy) - $V_3(5) = 60$ možností



$$60 - 12 = 48 \text{ možností}$$

II. Permutace

Permutace

Permutace je libovolné **uspořádaní** množiny M o n prvcích, kdy ve výsledném uspořádání (výsledné uspořádané n -tici) se prvky **nesmí opakovat**.

Počet všech různých permutací (počet všech různých uspořádaných n -tic) prvků množiny M je roven číslu

$$P(n) = n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, \quad n \geq 1.$$

- $0! = 1$
- Permutace je speciálním případem variace

$$P(n) = V_n(n) = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$$

II. Permutace

Permutace

Permutace je libovolné **uspořádaní** množiny M o n prvcích, kdy ve výsledném uspořádání (výsledné uspořádané n -tici) se prvky **nesmí opakovat**.

Počet všech různých permutací (počet všech různých uspořádaných n -tic) prvků množiny M je roven číslu

$$P(n) = n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1, \quad n \geq 1.$$

- $0! = 1$
- Permutace je speciálním případem variace

$$P(n) = V_n(n) = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$$

Permutace - příklad parlament

Příklad (Parlament)

S připomínkami k navrhovanému zákonu chce v parlamentu vystoupit 6 poslanců A, B, C, D, E, F. Určete počet

- a) všech možných pořadí jejich vystoupení,*
- b) všech pořadí, v nichž vystupuje A po E,*
- c) všech pořadí, v nichž vystupuje A ihned po E.*

Nějaký nápad?

Permutace - příklad parlament

Příklad (Parlament)

S připomínkami k navrhovanému zákonu chce v parlamentu vystoupit 6 poslanců A, B, C, D, E, F. Určete počet

- a) *všech možných pořadí jejich vystoupení,*
- b) *všech pořadí, v nichž vystupuje A po E,*
- c) *všech pořadí, v nichž vystupuje A ihned po E.*

Řešení a)

- počet všech uspořádání 6 různých prvků

$$\Rightarrow P(6) = 6! = 720 \text{ možností}$$

Permutace - příklad parlament

Příklad (Parlament)

S připomínkami k navrhovanému zákonu chce v parlamentu vystoupit 6 poslanců A, B, C, D, E, F. Určete počet

- a) *všech možných pořadí jejich vystoupení [6!]*
- b) *všech pořadí, v nichž vystupuje A po E,*
- c) *všech pořadí, v nichž vystupuje A ihned po E.*

Řešení b)

- každému pořadí E po A odpovídá právě 1 pořadí A po E

$$(A, B, C, D, E, F) \leftrightarrow (E, B, C, D, A, F)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot P(6) = \frac{1}{2} \cdot 6! = 360 \text{ možností}$$

Permutace - příklad parlament

Příklad (Parlament)

S připomínkami k navrhovanému zákonu chce v parlamentu vystoupit 6 poslanců A, B, C, D, E, F. Určete počet

- a) *všech možných pořadí jejich vystoupení [6!]*
- b) *všech pořadí, v nichž vystupuje A po E [$\frac{1}{2} \cdot 6!$]*
- c) *všech pořadí, v nichž vystupuje A ihned po E.*

Řešení c)

- A ihned po E spojíme v jednoho hypotetického poslance EA
- počet všech uspořádání 5 různých prvků B, C, D, F, EA

$$\Rightarrow P(5) = 5! = 120 \text{ možností}$$

III. Kombinace

Kombinace

Kombinace je libovolná **neuspořádaná** k -tice sestavená z prvků množiny M o n prvcích tak, že každý se v ní vyskytuje **nejvýše jednou** (prvky se **nesmí opakovat** a **nezáleží na jejich pořadí**).

Počet k -prvkových kombinací sestavených z n -prvkové množiny je roven kombinačnímu číslu (čteme „ n nad k “)

$$C_k(n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k \leq n.$$

III. Kombinace

Kombinace


Kombinace je libovolná **neuspořádaná** k -tice sestavená z prvků množiny M o n prvcích tak, že každý se v ní vyskytuje **nejvýše jednou** (prvky se **nesmí opakovat** a **nezáleží na jejich pořadí**).

Počet k -prvkových kombinací sestavených z n -prvkové množiny je roven kombinačnímu číslu (čteme „en nad k“)

$$C_k(n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k \leq n.$$

Počet k -prvkových kombinací z n prvků

- např. $M = \{a, b, c, d\}$, $n = 4$, $k = 3$



$$C_k(n) = \frac{1}{k!} \cdot V_k(n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Základní vlastnosti kombinačních čísel

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

$$\binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$$

Pascalův trojúhelník

1. řádek	1	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
2. řádek	1 1	$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
3. řádek	$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 1	$\textcircled{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}} + \textcircled{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}}$ $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
4. řádek	1 $\textcircled{3}$ 3 1	$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\textcircled{\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \Rightarrow$ symetrie

Binomická věta

$$(a+b)^n = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n} b^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$(a+b)^1$	$a+b$	1	1				
$(a+b)^2$	$a^2+2ab+b^2$	1	2	1			
$(a+b)^3$	$a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$	1	3	3	1		
$(a+b)^4$	$a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$	1	4	6	4	1	
$(a+b)^5$	$a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5$	1	5	10	10	5	1

Kombinace - příklad šachovnice

Příklad (Šachovnice)

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 vybrat

- a) trojici políček,*
- b) trojici políček neležících ve stejném sloupci,*
- c) trojici políček neležících ve stejném sloupci ani stejné řadě,*
- d) trojici políček, která nejsou všechna stejné barvy.*

Nějaký nápad?

Příklad (Šachovnice)

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 vybrat

- a) trojici políček,
- b) trojici políček neležících ve stejném sloupci,
- c) trojici políček neležících ve stejném sloupci ani stejné řadě,
- d) trojici políček, která nejsou všechna stejné barvy.

Řešení a)

- šachovnice ... 64 políček
- vybíráme 3 políčka
- nezáleží na pořadí

$$\Rightarrow C_3(64) = \binom{64}{3} = \frac{64 \cdot 63 \cdot 62}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 41664 \text{ možností}$$

Příklad (Šachovnice)

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 vybrat

- a) trojici políček (41664 možností)
- b) trojici políček neležících ve stejném sloupci,
- c) trojici políček neležících ve stejném sloupci ani stejné řadě,
- d) trojici políček, která nejsou všechna stejné barvy.

Řešení b)

- trojice políček na šachovnici ... $\binom{64}{3}$ možností
- vybíráme 3 políčka ležící v 1 zvoleném sloupci, nezáleží na pořadí

$$C_3(8) = \binom{8}{3} = 56 \text{ možností}$$

- 8 různých sloupců

$$\Rightarrow \binom{64}{3} - 8 \binom{8}{3} = 41216 \text{ možností}$$

Příklad (Šachovnice)

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 vybrat

- a) trojici políček (41664 možností),
- b) trojici políček neležících ve stejném sloupci (41216 možností),
- c) trojici políček neležících ve stejném sloupci ani stejné řadě,
- d) trojici políček, která nejsou všechna stejné barvy.

Řešení c)

- trojice políček na šachovnici ... $\binom{64}{3}$ možností
- trojice políček ležících ve stejném sloupci ... $8\binom{8}{3}$ možností
- trojice políček ležících ve stejném řádku ... $8\binom{8}{3}$ možností

$$\Rightarrow \binom{64}{3} - 8\binom{8}{3} - 8\binom{8}{3} = 40768 \text{ možností}$$

Příklad (Šachovnice)

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 vybrat

d) *trojici políček, která nejsou všechna stejné barvy.*

Řešení d)

- trojice políček na šachovnici ... $\binom{64}{3}$ možností
- trojice bílých políček ... $\binom{32}{3}$ možností
- trojice černých políček ... $\binom{32}{3}$ možností

$$\Rightarrow \binom{64}{3} - \binom{32}{3} - \binom{32}{3} = 31744 \text{ možností}$$

Příklad (Šachovnice)

Určete, kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 vybrat

d) *trojici políček, která nejsou všechna stejné barvy.*

Řešení d) *alternativní postup*

- **2 volby:** 2 políčka bílá a 1 černé nebo 2 políčka černá a 1 bílé
- výběr 2 políčka bílá a 1 černé ... $\binom{32}{2} \cdot 32$ **možností**

$$\Rightarrow 2 \cdot \binom{32}{2} \cdot 32 = \mathbf{31744 \text{ možností}}$$

1.3 Skupiny s opakováním

Kolika způsoby lze z n prvkové množiny $\{a_1, \dots, a_n\}$ vybrat k prvků (prvky se mohou opakovat)?

- uspořádaná k -tice: **variace s opakováním**,
permutace s opakováním
- neuspořádaná k -tice: **kombinace s opakováním**

I. Variace s opakováním

Počet k -prvkových variací s opakováním

Z množiny $M = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n\}$ vybíráme uspořádané k -tice

uspořádaná k -tice	1. člen	2. člen	$\dots$	$(k - 1)$. člen	k . člen
počet možností	n	n	$\dots$	n	n

kombinatorické pravidlo součinu



$$V_k^*(n) = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k \times} = n^k$$

I. Variace s opakováním

Počet k -prvkových variací s opakováním

Z množiny $M = \{a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n\}$ vybíráme uspořádané k -tice

uspořádaná k -tice	1. člen	2. člen	$\dots$	$(k - 1)$. člen	k . člen
počet možností	n	n	$\dots$	n	n

kombinatorické pravidlo součinu



$$V_k^*(n) = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_{k \times} = n^k$$

Variace s opakováním

Variace s opakováním

Variace s opakováním je libovolná **uspořádaná** k -tice sestavená z prvků množiny o n prvcích (prvky se **mohou opakovat** a **záleží na jejich pořadí**).

Počet všech k -prvkových variací s opakováním sestavených z n -prvkové množiny je roven číslu

$$V_k^*(n) = n^k.$$

Variace s opakováním - příklad SPZ

Příklad (SPZ)

V jisté zemi je SPZ aut tvořena uspořádanou sedmicí tak, že první 3 členy jsou písmena, další 4 jsou číslice. Určete počet různých SPZ, můžeme-li pro první část značky použít každé z 28 písmen a pro druhou část každou z deseti číslic 0, 1, ..., 9.

Nějaký nápad?

Příklad (SPZ)

V jisté zemi je SPZ aut tvořena uspořádanou sedmicí tak, že první 3 členy jsou písmena, další 4 jsou číslice. Určete počet různých SPZ, můžeme-li pro první část značky použít každé z 28 písmen a pro druhou část každou z deseti číslic 0, 1, ..., 9.

Řešení

- 1. část: vybíráme 3 písmena z 28 různých písmen, záleží na pořadí, mohou se opakovat

$$V_3^*(28) = 28^3$$

- 2. část: vybíráme 4 číslice z 10 různých číslic, záleží na pořadí, mohou se opakovat

$$V_4^*(10) = 10^4$$

kombinatorické pravidlo součinu $\Rightarrow$

$$V_3^*(28) \cdot V_4^*(10) = 28^3 \cdot 10^4 = 219\,520\,000 \text{ možností}$$

Permutace s opakováním

Permutace s opakováním

Permutace je libovolná **uspořádaná** k -tice sestavená z prvků množiny o n prvcích tak, že každý se v ní vyskytuje **alespoň jednou** (ve výsledné k -tici se prvky **mohou opakovat**).

Počet všech různých k -členných permutací s opakováním sestavených z n -prvkové množiny tak, že prvek a_1 se v nich vyskytuje k_1 -krát, prvek a_2 se opakuje k_2 -krát, atd. až prvek a_n se opakuje k_n -krát, přičemž $k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$, je roven

$$P^*(k_1, \dots, k_n) = \frac{(k_1 + k_2 + \dots + k_n)!}{k_1! k_2! \cdot \dots \cdot k_n!}.$$

- $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 1$... permutace bez opakování

Permutace s opakováním - příklad slova

Příklad (Slova)

*Určete počet způsobů, jimiž lze přemístit písmena slova
ABRAKADABRA.*

Nějaký nápad?

Příklad (Slova)

*Určete počet způsobů, jimiž lze přemístit písmena slova
ABRAKADABRA.*

Řešení

- počet všech slov = permutace vytvořená z písmen

písmeno	A	B	D	K	R
počet výskytů	5	2	1	1	2

$$P^*(5, 2, 1, 1, 2) = \frac{(5 + 2 + 1 + 1 + 2)!}{5!2!1!1!2!} = \frac{11!}{480} = 83160 \text{ slov}$$

Kombinace s opakováním

Kombinace s opakováním

Kombinace s opakováním je libovolná **neuspořádaná** k -tice sestavená z prvků množiny M o n prvcích (prvky se **mohou opakovat** a **nezáleží na jejich pořadí**).

Počet k -prvkových kombinací s opakováním sestavených z n -prvkové množiny je roven kombinačnímu číslu

$$C_k^*(n) = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}.$$

Kombinace s opakováním

Příklad (Mince)

Kolik různých částek lze zaplatit 3 mincemi, máme-li v peněžence korunové, dvoukorunové a pětikorunové mince, každý druh alespoň pětkrát?

Nějaký nápad?

Příklad (Mince)

Kolik různých částek lze zaplatit 3 mincemi, máme-li v peněžence korunové, dvoukorunové a pětikorunové mince, každý druh alespoň pětkrát?

Řešení

- tři různé druhy mincí (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč), každá alespoň 5×: $n = 3$
- platba 3 mincemi: $k = 3$
- počet různých částek: 3-prvková kombinace s opakováním

$$C_k^*(n) = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

$$C_3^*(3) = \binom{3+3-1}{3} = \binom{5}{3} = \binom{5}{2} = 10 \text{ možností}$$

Shrnutí

Základní kombinatorická pravidla

- součtu
- součinu

Skupiny bez opakování

- **Variace:** uspořádaná k -tice

$$V_k(n) = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad k \leq n$$

- **Permutace:** uspořádaná n -tice

$$P(n) = n!$$

- **Kombinace:** neuspořádaná k -tice

$$C_k(n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad k \leq n$$

Shrnutí

Skupiny s opakováním

- **k -prvková variace s opakováním z n prvků:** uspořádaná k -tice

$$V_k^*(n) = n^k$$

- **k -prvková permutace s opakováním z n prvků:** uspořádaná k -tice

$$P^*(k_1, \dots, k_n) = \frac{(k_1 + \dots + k_n)!}{k_1! \dots k_n!}, \quad k = k_1 + \dots + k_n$$

- **k -prvková kombinace s opakováním z n prvků:** neuspořádaná k -tice

$$C_k^*(n) = \binom{n+k-1}{k} = P^*(k, n-1)$$

Excel: Příkazy pro kombinatoriku

Kombinatorické výpočty:

- **Permutace (bez opakování):** $P(n) = n!$
=FAKTORIÁL (n)
- **Variace (bez opakování):** $V_k(n) = \frac{n!}{(n-k)!}$
=PERMUTACE (n; k)
- **Variace (s opakováním):** $V_k^*(n) = n^k$
= n^k
- **Kombinace (bez opakování):** $C_k(n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
=KOMBINACE (n; k)
- **Kombinace (s opakováním):** $C_k^*(n) = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$
=KOMBINACE (n+k-1; k)

Procvičování 1

- Státní poznávací značku tvoří dvě písmena, tři číslice a další dvě písmena (formát AAXXXAA, kde A je písmeno a X číslice). Kolik různých značek lze vytvořit, pokud můžeme vybírat z 25 písmen a 10 číslic? [390 625 000]
- Kolik různých šestimístných čísel lze sestavit z cifer 1, 2 a 3, pokud se cifry mohou opakovat? [729]
- Na MHD se kdysi používaly lístky s devíti čtverečky označenými čísly 1 až 9. Po nastoupení cestující zasunul lístek do strojeku, který prodírkoval tři nebo čtyři z nich (specificky pro dané vozidlo a den). Kolik je různých způsobů prodírkování lístku? [210]

Procvičování 2

- Kolika způsoby může sedět v kině sedm kamarádů (A, B, C, D, E, F, G) na sedadlech 1 až 7 tak, aby kamarád B seděl na sedadle č. 4 a kamarád G na sedadle č. 2? [120]
- Do tanečního kroužku přišlo 24 chlapců a 15 dívek. Kolik různých párů lze vytvořit, pokud pár tvoří vždy dvojice chlapec-dívka? [360]
- Ve třídě je 20 žáků. Kolika způsoby lze vybrat dvojici pro týdenní službu? [190]

Procvičování 3

- Kolik hráčů se zúčastnilo turnaje ve stolním tenise, pokud se v dvouhře odehrálo 21 utkání a každý hráč hrál s každým právě jednou? [7]
- Ve třídě je 20 dívek a 15 chlapců. Kolik různých pětičlenných hlídek na branné závody lze vytvořit, pokud v každé hlídce mají být 3 dívky a 2 chlapci? [119 700]
- Hokejové družstvo má 20 hráčů: 13 útočníků, 5 obránců a 2 brankáře. Kolik různých sestav může trenér vytvořit, pokud sestava má obsahovat 3 útočníky, 2 obránce a 1 brankáře? [5 720]

Procvičování 4

- Učitel má k dispozici 20 aritmetických a 30 geometrických úloh. Na písemné práci mají být dvě aritmetické a tři geometrické úlohy. Kolik má učitel možností k vytvoření písemné práce? [771 400]
- Ze 7 mužů a 4 žen máme vytvořit 6člennou skupinu, ve které mají být 3 ženy. Kolika způsoby lze takovou skupinu vytvořit? [140]
- Učitel má vybrat na recitační soutěž tři studenty ze třídy 3.A a dva studenty ze třídy 3.B. V 3.A je 22 studentů a v 3.B je 17 studentů. Kolik má učitel možností výběru? [209 440]

Procvičování 5

- Kolik existuje způsobů, jak uspořádat sedadla pro kamarády A, B, C, D a E tak, aby kamarád A seděl vedle kamaráda C? [48]
- Latinská abeceda má 26 písmen. Kolik různých 6písmenných „slov“ lze vytvořit, pokud písmena mohou být opakována? [308 915 776]
- Státní poznávací značku tvoří 7 znaků. Na prvních třech pozicích může být číslice nebo písmeno, na zbývajících čtyřech jen číslice. Kolik různých značek lze vytvořit, pokud použijeme 28 písmen a 10 číslic? [548 720 000]
- Na hodině tělesné výchovy stojí v řadě 5 dívek, z nichž dvě jsou sestry. Kolika způsoby lze rozestavit dívky tak, aby sestry stály vedle sebe? [48]